

اسکن هیپاتوبیلیاری

اسکن هیپاتوبیلیاری

1 - 6 ساعت قبل از انجام اسکن ناشتا باشید.

برای کودکان زمان ناشتایی 2 تا 4 ساعت و

برای نوزادان 2 ساعت می باشد. مدت

ناشتایی نباید از 24 ساعت بیشتر باشد.

1 - در نوزادان زیر 6 ماه که برای بررسی

انسداد مجاری صفراوی و یا هیپاتیت نوزادی

کاندیدای انجام اسکن هستند ناشتایی لازم

نیست. ولی نیاز به آمادگی قبلی با شربت

فنوباربیتال دارد. در خصوص بلامانع بودن

این دارو با پوشک معالج کودکان مشورت

کنید. جهت دریافت نسخه و دریافت دستورات

لازم به پزشک مرکز مراجعه فرمایید.

2 - اگر در چند روز اخیر اقدامات پزشکی هسته

ای و یا تصویر برداری با باریوم انجام داده

اید پرسنل مرکز را هم در زمان تعیین وقت

و هم در روز انجام اسکن مطلع فرمایید.

3 - مصرف مخدر ها و یا هرگونه داروی ضد

درد مخدری با عث بروز اشکال در نتایج

اسکن می شود و باید حداقل از 6 ساعت قبل

از انجام اسکن مصرف نشده باشند.

احتیاطات کلی

1 - در صورت شیردهی، حاملگی و یا حتی شک به

آن پرسنل مرکز را هم در زمان تعیین وقت و هم

در روز انجام اسکن مطلع فرمایید.

2 - حضور یک نفر به عنوان همراه الزامی است. از

آوردن کودکان و خانم های باردار به عنوان

همراه اکیداً خودداری فرمایید.

3 - در صورت داشتن هرگونه سابقه حساسیت اعم از

دارویی، غذایی، پوستی و تنفسی پرسنل مرکز را

هم در زمان تعیین وقت و هم در روز انجام اسکن

مطلع فرمایید.

4 - روز انجام اسکن لباس گشاد و راحت بپوشید.

اتاق انجام اسکن ممکن است کمی خنک باشد لذا از

پوشیدن لباس نازک خودداری فرمایید. بهتر است

لباستان از جلو دکمه داشته باشد که به راحتی باز

شود. لباستان اجزای فلزی نظیر دکمه فلزی، قفل

فلزی و غیره نداشته باشد.

5 - اگر در چند روز اخیر اقدامات پزشکی هسته ای

و یا تصویر برداری با باریوم انجام داده اید

پرسنل مرکز را هم در زمان تعیین وقت و هم در

روز انجام اسکن مطلع فرمایید.

6 - تزریق رادیوداروی پزشکی هسته ای بسیار کم

خطر و بی عارضه است.



نام و نام خانوادگی.....

تاریخ.....

ساعت.....

آدرس: تهران - دارآباد- انتهای خیابان شهید
پور ابتهاج- مرکز آموزشی پژوهشی درمانی
مسیح دانشوری- ساختمان ...- طبقه
همکف- بخش پزشکی هسته ای - تلفن

.....

آدرس سایت :

7 - لطفاً کلیه داروهای مصرفی خود را در روز انجام

اسکن همراه داشته باشید.

8 - معمولاً بعد از انجام این اسکن نیاز به مراقبت

خاصی نیست. در طی 24 ساعت اول بعد از

تزریق داروی حاوی تکنسیوم بهتر است مایعات

فراوان استفاده کنید (مگر بر اساس نظر پزشک

معالجتان محدودیت مصرف مایعات داشته باشید)

و مرتب ادرار کنید. این کار به دفع سریعتر

رادیودارو از بدن شما کمک می کند. شما می توانید

فعالیت های روزانه خود را مطابق معمول انجام

دهید. محدودیتی برای خوردن، آشامیدن و مصرف

داروهای قبلی بعد از اتمام اسکن وجود ندارد.

9 - ضروری است به مدت 24 ساعت از تماس نزدیک

با خانم های باردار و کودکان زیر 18 سال

خودداری فرمایید.