

# اسکن دیورنیکول مکل

- 1 - 4 ساعت قبل از انجام اسکن ناشتا باشید. اگر زمان انجام اسکن شما قبل از 12 ظهر است از نیمه شب ناشتا باشید و اگر زمان انجام اسکن بعد از 12 ظهر است یک صبحانه سبک قبل از ساعت 8 میل کنید و سپس تا زمان انجام اسکن ناشتا بمانید. مصرف دارو با مقدار کمی آب بلامانع است.
- 2 - باید 2 روز قبل از انجام اسکن دارویی سایمتیدین مصرف شود. جهت دریافت نسخه و دستورات لازم به پزشک مرکز مراجعه فرمایید.
- 3 - اگر در چند روز اخیر اقدامات پزشکی هسته ای و یا تصویر برداری با باریوم انجام

- داده اید پرسنل مرکز را هم در زمان تعیین وقت و هم در روز انجام اسکن مطلع فرمایید
- 4 - لطفاً کلیه اقدامات تشخیصی که برای بیماری فعلی تان انجام شده اعم از CT scan، کولونوسکوپی و اسکن های قبلی خود را در روز انجام اسکن همراه داشته باشید.
- 5 - در روز انجام اسکن لباس راحت و کمی گرم به تن کنید.
- 6 - هیچگونه وسیله فلزی اعم از دکمه های فلزی، سکه، قلاب کمر بند، جواهرات و غیره همراه نداشته باشید.
- 7 - والدین کودکان اجازه حضور در کنار کودک خود را در تمام مراحل اسکن خواهند داشت.
- 8 - در کودکانی که از پوشک استفاده می کنند لازم است بلافاصله قبل از قرار گرفتن زیر

دستگاه پوشک تعویض شود لذا همراه داشتن پوشک اضافی الزامی است.

## احتیاطات کلی

- 1 - در صورت شیردهی، حاملگی و یا حتی شک به آن پرسنل مرکز را هم در زمان تعیین وقت و هم در روز انجام اسکن مطلع فرمایید.
- 2 - حضور یک نفر به عنوان همراه الزامی است. از آوردن کودکان و خانم های باردار به عنوان همراه اکیداً خودداری فرمایید.
- 3 - در صورت داشتن هرگونه سابقه حساسیت اعم از دارویی، غذایی، پوستی و تنفسی پرسنل مرکز را هم در زمان تعیین وقت و هم در روز انجام اسکن مطلع فرمایید.
- 4 - روز انجام اسکن لباس گشاد و راحت بپوشید. اتاق انجام اسکن ممکن است کمی خنک باشد لذا از



نام و نام خانوادگی.....

تاریخ.....

ساعت.....

آدرس: تهران - دارآباد- انتهای خیابان شهید  
پور ابتهاج- مرکز آموزشی پژوهشی درمانی  
مسیح دانشوری- ساختمان ...- طبقه  
همکف- بخش پزشکی هسته ای - تلفن

.....

آدرس سایت : .....

معالجتان محدودیت مصرف مایعات داشته باشید)

و مرتب ادرار کنید. این کار به دفع سریعتر

رادیودارو از بدنتان کمک می کند. شما می توانید

فعالیت های روزانه خود را مطابق معمول انجام

دهید. محدودیتی برای خوردن، آشامیدن و مصرف

داروهای قبلی بعد از اتمام اسکن وجود ندارد.

9 - ضروری است به مدت 24 ساعت از تماس نزدیک

با خاتم های باردار و کودکان زیر 18 سال

خودداری فرمایید.

پوشیدن لباس نازک خودداری فرمایید. بهتر است

لباستان از جلو دکمه داشته باشد که به راحتی باز

شود. لباستان اجزای فلزی نظیر دکمه فلزی، قفل

فلزی و غیره نداشته باشد.

5 - اگر در چند روز اخیر اقدامات پزشکی هسته ای

و یا تصویر برداری با باریوم انجام داده اید

پرسنل مرکز را هم در زمان تعیین وقت و هم در

روز انجام اسکن مطلع فرمایید.

6 - تزریق رادیوداروی پزشکی هسته ای بسیار کم

خطر و بی عارضه است.

7 - لطفاً کلیه داروهای مصرفی خود را در روز انجام

اسکن همراه داشته باشید.

8 - معمولاً بعد از انجام این اسکن نیاز به مراقبت

خاصی نیست. در طی 24 ساعت اول بعد از

تزریق داروی حاوی تکنسیوم بهتر است مایعات

فراوان استفاده کنید (مگر بر اساس نظر پزشک